



"برنامه غذایی درخت آلبالو شهر گیاه"

| قبل از گلدهی | بعد از گلدهی | قبل از برداشت محصول | بعد از برداشت محصول |
|--|--|--|--|
| کلات آهن ۶ تا ۴۰ گرم هر درخت بارده | عناصر میکرو ۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | عناصر میکرو ۱ تا ۵/۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | روی ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی |
| ۲۰-۲۰-۲۰ ۱۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار- آبکود | کلسیم ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | کلسیم ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | بر ۱ تا ۵/۱ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی |
| هیومیک اسید ۴ تا ۳ کیلوگرم در هکتار-آبکود | سولفات پتاسیم ۱۰ تا ۱ کیلوگرم در هکتار-آبکود | سولفات پتاسیم ۱۰ تا ۱ کیلوگرم در هکتار-آبکود | |
| | ۱۰-۵۲-۱۰ ۳ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | هیومیک اسید ۴ تا ۳ کیلوگرم در هکتار-آبکود | |
| | فسفیت پتاسیم ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | فسفیت پتاسیم ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | |
| | | ۱۵-۵-۳۰ ۳ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | |

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.