

## "برنامه غذایی توت فرنگی شهر گیاه"

میوه دهی پاییز	بعد از هرس تابستان	میوه دهی	رشد رویشی	ابتدای رشد بهاره
نیترات کلسیم 10 تا 15 کیلوگرم-آبکود	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	نیترات کلسیم 10 تا 15 کیلوگرم- آبکود	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	10-52-10 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود
کلسیم بر 2 لیتر در هکتار-محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود	کلسیم بر 2 لیتر در هکتار- محلول پاشی	عناصر میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در هکتار-محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود
سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار- آبکود	10-10-10 1/5 کیلوگرم در هکتار- محلول پاشی	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	10-10-10 1/5 کیلوگرم در هکتار- محلول پاشی	فسفیت پتاسیم 5 لیتر در هکتار- محلول پاشی
	فروت ست 1 کیلوگرم در هکتار- محلول پاشی		سیلیسیم بودر 2 کیلوگرم در هکتار-محلول پاشی	اسید آمینه 1 کیلوگرم در هکتار -محلول پاشی
	بر 1 کیلوگرم در هکتار- محلول پاشی		روی 1 کیلوگرم در هکتار- محلول پاشی	کلات آهن 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار -آبکود
	کلات آهن 3 تا 1 کیلوگرم در هکتار -آبکود		فروت ست 1 کیلوگرم در هکتار-محلول پاشی	

## توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.

