



"برنامه غذایی زیتون شهر گیاه"

افزایش اندازه میوه	سفت شدن هسته	قبل از گلدهی	رشد ساقه
	هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار-آبکود	هیومیک اسید 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب - محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار-آبکود
15-5-30	15-5-30 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	روی 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب - محلول پاشی	10-52-10 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود
سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار- آبکود	سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود	
کلسیم بر 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب - محلول پاشی	کلسیم بر 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب - محلول پاشی	فروت ست 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب- محلول پاشی	
عناصر میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی		عناصر میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	
		بر 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب - محلول پاشی	



- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.