



"برنامه غذایی درختان مرکبات شهر گیاه"

بعد از برداشت محصول	قبل از برداشت محصول	بعد از گلدهی	قبل از گلدهی
فروت ست 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی	15-5-30 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	10-52-40 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	فروت ست 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب- محلول پاشی
	سولفات پتاسیم 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار- آبکود	سولفات پتاسیم 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار- آبکود	عناصر میکرو 10 کیلوگرم در هکتار-آبکود
	کلسیم بر 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	کلسیم بر 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	فسفیت پتاسیم 3 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب- محلول پاشی
	هیومیک اسید 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار- آبکود	عناصر میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی
	عناصر میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی	10-10-10 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی	20-20-20 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی
			کلات آهن 40 تا 60 گرم هر درخت بارده- آبکود
			عناصر میکرو 10 کیلوگرم در هکتار-آبکود
			نیترات کلسیم 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار- آبکود
			روی 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی



توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.