

"برنامه غذایی کلزا شکر کدو"

| در مرحله تشکیل پیله و دانه بندی | از گلدهی تا تشکیل غلاف | از فروردین تا قبل از گلدهی | بعد از 2 برگی |
|--|---|---|--|
| سولفات پتاسیم 20 کیلوگرم در هکتار-آبکود | اوره فسفات 20 کیلوگرم در هکتار-آبکود | 30-5-5 15 کیلوگرم در هکتار- آبکود | 20-20-20 15 کیلوگرم-آبکود |
| | عناصر میکرو 1 کیلوگرم در هکتار-محلول پاشی | | 30-5-5 15 کیلوگرم در هکتار- آبکود |
| | | | سولفات پتاسیم 20 کیلوگرم در هکتار- آبکود |

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.