



"برنامه غذایی درخت گردو شهر گیاه"

| میانہ زمستان | قبل از گلدهی | بعد از گلدهی | قبل از برداشت محصول | بعد از برداشت محصول |
|---|---|---|--|---|
| سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود | فروت ست 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | نیتروژن مایع 3 تا 4 لیتر در هکتار- آبکود | عناصر میکرو 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی | فروت ست 1 تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی |
| عناصر میکرو 10 کیلوگرم در هکتار- آبکود | 20-20-20 20 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود | 10-52-10 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی | 15-5-30 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب- محلول پاشی | 10-10-10 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب-محلول پاشی |
| کلات آهن 40 تا 60 گرم هر درخت بارده-چالکود | میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در در هزار لیتر آب- محلول پاشی | میکرو+اسید آمینه 1 تا 1/5 کیلوگرم در در هزار لیتر آب- محلول پاشی | فسفیت پتاسیم 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | سولفات پتاسیم 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار-آبکود |
| هیومیک اسید 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود | کلات آهن 40 تا 60 گرم هر درخت بارده-آبکود | هیومیک اسید 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود | هیومیک اسید 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود | هیومیک اسید 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار-آبکود |
| اسید فولویک 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | اسید فولویک 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | اسید فولویک 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | اسید فولویک 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی | اسید فولویک 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب-محلول پاشی |



توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان جذب عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.