



"برنامه غذایی گوجه فرنگی شهر گیاه"

تورم تا رسیدن گوجه	قبل از گلدهی	مراحل اولیه رشد	آبیاری اول
سولفات پتاسیم 15 تا 10 کیلوگرم در هکتار - آبکود	عناصر میکرو 5 تا 8 کیلوگرم در هکتار - آبکود	فسفیت پتاسیم 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	هیومیک اسید 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار - آبکود
کلسیم + بر 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	فسفیت پتاسیم 1 تا 2 لیتر در هکتار - محلول پاشی	عناصر میکرو + اسید آمینه 1 تا 5/1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	10-52-10 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود
	20-20-20 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	20-20-20 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار - آبکود	
	کلسیم + بر 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	هیومیک اسید 5/1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	
		10-10-10 1 کیلوگرم در هکتار - محلول پاشی	

توجه:

- برنامه غذایی گفته شده بصورت کلی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شهر گیاه در ارتباط باشید.
- برنامه گفته شده در صورتی که از کودها در زمان مناسب و به مقدار مناسب مصرف شود نتیجه دهی خواهد داشت.
- زمان های گفته شده در جدول بهترین زمان برای عناصر می باشد.
- بهتر است محلول پاشی در هنگام صبح زود و یا بعد از ظهر انجام شود.
- قبل از اختلاط کودها حتما تست اختلاط پذیری انجام شود.